

ТРОВАЊА КОД ДЕЦЕ БИЉКАМА И ГЉИВАМА

...И КАКО ИХ
СПРЕЧИТИ



ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД



Београд
www.beograd.rs

ДАЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

**Тровања изазвана
биљкама и гљивама код
деце чешћа су него што
се претпоставља -
готово свако друго
тровање малишана у
Србији потиче управо од
конзумације наизглед
безопасних биљака и
печурака**

**У КОМ УЗРАСТУ
НАЈЧЕШЋЕ ДОЛАЗИ
ДО ТРОВАЊА?**

**Од друге до пете године
живота**

ЗБОГ ЧЕГА ДОЛАЗИ ДО ТРОВАЊА?

Деца су по природи
знатижељна и склона
истраживању света око
себе - воле све да пипну,
омиришу, па чак и
пробају!

ГДЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА БИЉКАМА И ГЉИВАМА?

Тамо где најчешће
проводе своје време

дворишта

дневне
собе

паркови

МНОГЕ БИЉКЕ И ГЉИВЕ
ДЕЛУЈУ БЕЗОПАСНО,
АЛИ ИЗАЗИВАЈУ
ТРОВАЊА!

КАКО ДОСПЕВАЈУ У ОРГАНИЗАМ ДЕТЕТА?

ГУТАЊЕМ

УДИСАЈЕМ

ПРЕКО КОЖЕ

**ХЕМИЈСКЕ СУПСТАНЦЕ У
БИЉКАМА КОЈЕ ДОВОДЕ
ДО ТРОВАЊА ЈЕСУ
АЛКАЛОИДИ, А КОД
ГЉИВА МИКОТОКСИНИ!**

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА СУ:

- **МУЧНИНА**
- **ПОВРАЋАЊЕ**
- **БОЛОВИ У СТОМАКУ**
- **ДИЈАРЕЈА**
- **ВРТОГЛАВИЦА**
- **ПОЈАВА ОСПЕ**
- **ХАЛУЦИНОГЕНИ СИНДРОМ**
(ХАЛУЦИНАЦИЈЕ+ПОВРАЋАЊЕ
+ДИЈАРЕЈА)

**У ТЕЖИМ
СЛУЧАЈЕВИМА
ДОЛАЗИ ДО
ПРОБЛЕМА СА
СРЦЕМ И
ДИСАЊЕМ!**

ЦИКЛАМА

...колико год лепо и привлачно изгледала, ова биљка може довести до озбиљних симптома тровања. Уколико се прогута корен, долази до болова у стомаку и повраћања.

...јесте биљка која је цела отровна.

Забележени су случајеви тровања од меда уколико су пчеле, које су и правиле ту врсту меда, јеле њихов цвет. Тровање изазива мучнину, дијареју, конфузију, а може и пореметити рад срца.

РОДОДЕНДРОН (АЗАЛЕЈА)



...су биљке које се често налазе у нашим домовима и које су целе отровне. Доводе до отицања језика и усана, а у неким тежим случајевима и до проблема са дисањем.

ФИЛОДЕНДРОН И ДИФЕНБАХИЈА





РИЦИНУС

...спада у изузетно отровне биљке, а највећа концентрација отрова се налази у његовом семену. Изазива црвенило, оспу и свраб по кожи. У најтежим случајевима долази до престанка рада срца.

...овај привлачан цвет је такође изузетно отрован, јер у случају гутања доводи до отицања грла, отежаног дисања, па чак и до парализе мишића и оштећење јетре.

САМО ДВА СЕМЕНА ОВЕ БИЉКЕ МОГУ БИТИ ОТРОВНА!

КЛИВИЈА

...због своје лепоте чест је украс у баштама. Међутим, ова биљка је изузетно отровна, доводи до наглог пада притиска, ремети чуло вида, а гутање само једног листа може бити смртоносно!



ОЛЕАНДЕР



ЉУТИЋ

...тровање љутићем може изазвати иритацију уста и слузокоже дигестивног тракта, као и повраћање, пролив и упале слузокоже црева.



ЂУРЂЕВАК

...је нежна и мирисна пролећна биљка са ситним белим звончићима који симболизују срећу и чистоту. Ипак, читава стабиљка је отровна, изазива мучнину, вртоглавицу и озбиљне срчане сметње.



ФЛАМИНГОВ ЦВЕТ

...јесте биљка која се често може наћи у кућним условима, а жвакање и гутање неких делова доводе до отицања усана, језика и стварање пликова на слузокожи усне дупње.



КАКО СПРЕЧИТИ ТРОВАЊА КОД ДЕЦЕ?

Разговарајте са децом о могућим опасностима пипкања и грицкања биљака или гљива!

Биљке држите ван домашаја деце у свим просторијама у кући!

Уколико не желите да се одрекнете зеленила у кући - замените их вештачким биљкама!

Док боравите у природи, носите мајице са дужим рукавима, као и дуге панталоне. На тај начин смањујете могућност контакта са биљкама!

Након контакта са биљкама и гљивама оперите руке себи и детету!

Немојте јести ништа што вам није познато док боравите у природи - многе биљке, попут отровних бобица могу личити на боровнице, као и разне гљиве које могу подсећати на јестиве врсте!





ПРВА ПОМОЋ КОД ТРОВАЊА


...У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО ГУТАЊА БИЉАКА ИЛИ ГЉИВА:

- **Уклоните остатке биљке или гљиве из усне дупље уколико су остали!**

- **Сачувајте остатке биљке или гљиве или повраћног садржаја јер то може бити од великог значаја за даљу анализу и постављање дијагнозе!**

- **Не изазивајте повраћање, осим ако вам то изричито не саветује здравствени радник!**

- **Немојте давати млеко, воду или храну!**
- **Позовите хитну помоћ (194) или дежурну службу токсикологије!**






ПРВА ПОМОЋ КОД ТРОВАЊА

...У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО ИНХАЛАЦИЈЕ БИЉАКА ИЛИ ГЉИВА:

- **Удаљите дете од биљке или гљиве!**
- **Позовите хитну помоћ (194) или дежурну службу токсикологије!**

...У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО КОНТАКТА КОЖЕ СА БИЉКОМ ИЛИ ГЉИВОМ:

- **Уклоните одећу и темељно исперите водом!**
- **Немојте наносити креме или масти на повређену кожу!**
- **Најбоље би било да позовете хитну помоћ (194) или дежурну службу токсикологије!**



БРОЈЕВИ ЗА ПОМОЋ:

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ - 194

**Установе које збрињавају отрована лица
на подручју града Београда:**

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА (ВМА) - Црнотравска бб (токсикологија за старије од 14 година)

- број дежурног токсиколога доступан 24 часа дневно : 011/ 3608-440
- бројеви телефона централе ВМА 011/2661-122, 011/ 2662-755

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, Тиршова 10 (токсикологија за децу млађу од 14 година)

- број телефона централе Клинике 011/ 2060-600
- Установа је дежурна сваког парног датума у месецу

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН ЧУПИЋ“, -Радоја Дакића 6-8 (токсикологија за децу млађу од 14 година)

- број телефона централе Института 011/ 3108 -108
- Установа је дежурна сваког непарног датума у месецу